54. évf. (2013) 1. szám, 43-52

Ipari eredetű szén-dioxid besajtolásának várható fizikai és kémiai hatásai a pórusfluidumra és a tárolókőzetre a Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás vizsgálata alapján

KIRÁLY CS.¹, SZAMOSFALVI Á.², FALUS GY.², SZABÓ CS.^{1,@}, SENDULA E.¹

¹Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Litoszféra Fluidum Kutató Labor (ELTE LRG), 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C ²Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI), 1143 Budapest, Stefánia út 14. [@]E-mail: cszabo@elte.hu

Az ipari eredetű szén-dioxid elhelyezésének biztonságával, a felszín alatti pórustérbe besajtolt CO₂ hosszú távú viselkedésével kapcsolatosan a természetes szén-dioxid-előfordulások vizsgálatából olyan értékes információhoz juthatunk, amelyet sem laboratóriumi kísérletek, sem modellezési munkák nem tudnak reprodukálni. A besajtolás következtében létrejövő fluidumrendszer hosszú távú viselkedésének ismerete azonban elengedhetetlen a CCS-technológia (Carbon Capture and Sequestration) hosszú távú biztonságosságának szavatolásához.

Magyarország legrégebben ismert és termelt CO₂-előfordulása Ny-Magyarországon, a Répcelak-Mihályi területen található. A több tucat, ipari termelésre is alkalmas szén-dioxid-telepről sok, szabadon hozzáférhető információ áll rendelkezésre, amelynek segítségével átfogó kép kapható – többek között – a fluidumrendszer összetételéről is, amely a kőzet–fluidum kölcsönhatás megismerésének egy fontos eleme.

Jelen tanulmány a Mihályi-Répcelak CO₂-előfordulás két reprezentatív telepének fluidumrendszerét tanulmányoztuk, és meghatároztuk kísérleti adatok segítségével, hogy a telepekben uralkodó nyomás–hőmérsékleti viszonyok mellett a fluidumrendszert szuperkritikus (sc.) CO₂, oldott CO₂-ot tartalmazó H₂O és vízgőz alkotja. A becslések alapján az adott rendszer 1 m³-nyi pórustérfogatából, fázisátalakulás nélkül ~210 kg CO₂ termelhető ki. Ennek hatására közel 0,2 egységgel növekszik a maradék oldat pH-ja, és csökken az ásványok oldhatósága. A CO₂ tárolásakor fordított reakció zajlik, azaz pH-csökkenés és az ásványok – különös tekintettel a kalcit és a földpát – oldhatóságának növekedése következik be. Ez pedig hatással van a tárolókőzetek petrofizikai (porozitás, permeabilitás) és kőzetmechanikai tulajdonságára.

Király, Cs., Szamosfalvi, Á., Falus, Gy., Szabó, Cs., Sendula, E.: Expected physical and chemical effects of injecting industrial carbon dioxide on pore fluids and reservoir rocks based on the study of Mihályi-Répcelak natural CO₂ occurrence

Natural CO_2 analogues are very important in studying the safety of geological storage of industrial CO_2 . In these analogues we can study the long term rock–fluid reactions, which cannot be reproduced in the lab or with computer models. Nevertheless, this information is essential to assure the long-term safety of CCS-technology.

The Mihályi-Répcelak area (Western Hungary) is the oldest known and produced CO_2 occurrence in Hungary. In this area there are dozens of CO_2 sites that are suitable for industrial production. As a consequence, many of the data are publicly available. Using these information we can build a comprehensive picture about the composition of the fluid system which is essential to understand the interactions within the given rock–fluid system.

In this study, the fluid system of two representative occurrences from the Mihályi-Répcelak CO₂ sites are studied, and characterized using the experimental data of the CO₂–H₂O–(NaCl) system. We determined that in the given pressure and temperature conditions of the fluid system, it is composed of supercritical (sc.) CO₂, CO₂ dissolved in H₂O, and vapor H₂O. We concluded that in the studied system ~210 kg of CO₂ could be produced from 1 m³ of pore volume, without phase change. As a result, nearly 0.2 unit pH increase of the residual solution system and a decrease of the solubility of the minerals are foreseen. In case of CO₂ storage inverse reactions take place, i.e. a decrease of pH and an increase of solubility of the minerals – especially calcite and feldspar. This in turn affects the petrophysical (porosity and permeability) and mechanical properties of the storage rocks as well.

Beérkezett: 2012. október 15.; elfogadva: 2013. június 6.

Bevezetés

Az emberi tevékenység által felszabadított és légkörbe juttatott üvegházhatású gázok - elsősorban a szén-dioxid kibocsátásának mérséklésében és ezáltal a klímaváltozás visszafogásában jelentős szerepe lehet a föld alatti széndioxid-tárolásnak (pl., Holloway 2007, Wildenborg et al. 2009). Az ipari szén-dioxid tárolásának egyik legfontosabb kérdése, hogy a tárolásra kiválasztott földtani közeg alkalmas-e a besajtolt CO2 biztonságos tárolására és hosszú távú visszatartására. Mivel a természetes szén-dioxid-tárolók bizonyítottan több százezer évig szivárgás és tönkremenetel nélkül képesek a pórusokban tárolt CO2-ot visszatartani, az ipari szén-dioxid felszín alatti tárolási lehetőségének vizsgálata a természetes tárolók részletes tanulmányozása nélkül nem képzelhető el. Jól tükrözi ezt, hogy a természetes előfordulások vizsgálata már az európai kutatási programok korai stádiumában is nagy szerepet kapott (pl., NASCENTprojekt, Czernikowski-Lauriol et al. 2002, Pearce et al. 2002).

A természetes tárolók vizsgálatából egyrészt információ nyerhető azokról a hosszú távon lejátszódó kőzet–fluidum rekciókról, amelyek laboratóriumi kísérletek között nem, vagy csak részben rekonstruálhatók. Másrészt megismerhetők azok a természetes ásvány-kőzettani illetve fluidumgeokémiai feltételek, amelyek hozzájárultak a természetes tárolórendszer hosszú távú stabilitásához.

A Pannon-medence területén számos természetes CO₂gáztelep, CO₂-gázszivárgás és nagy CO₂-tartalommal jellemezhető termálvíz előfordulása ismert (Pearce et al. 2005, Vető et al. 2003). Ez utóbbi tanulmány a Mihályi-Répcelak gázmezők és a Mátraderecske gázszivárgás és az ehhez kapcsolódó termálvizek CO₂ gázai geokémiai adatainak tárházának tekinthető, ami kiváló alapot ad további kutatásokhoz.

Jelen tanulmányban a rendelkezésre álló geokémiai és mélyfúrási adatok felhasználásával bemutatjuk, hogy a Répcelak-Mihályi természetes szén-dioxidos rendszer termelése milyen fizikai és kémiai változásokat okoz a rezervoárban, és milyen fizikai paraméterek mellett lehetséges a CO₂ gáz biztonságos kitermelése. Továbbá számításaink arra is rávilágítottak, hogy fordított esetben – azaz a szén-dioxid mint szuperkritikus fluidum besajtolásakor – melyek azok a fizikai és kémiai körülmények, amelyekre feltétlenül figyelni kell egy CO₂-tárolási projekt tervezésekor.

Kutatástörténet

A Répcelak-Mihályi kutatási terület a Kisalföld területén, a Rábaköz nyugati felén található. A térségben 1933-ban kezdődött meg a geofizikai kutatás. 1935-ben mélyítették az első fúrást és 32 évvel később az utolsót. A geofizikai mérések a Kisalföldön nagy kiterjedésű maximumot jeleztek, amely 3 részre – Répcelak, Mihályi és Mosonszentjános – tagolja a területet.

Az említett első, M-1 jelű fúrást 1935-ben a Mihályi részmaximumra telepítették. A fúrás 1602 méterben paleozoos metamorf fillitet ütött meg pliocén üledéksor alatt; ez utóbbiból jelentős CO2-termelés kezdődött meg. A későbbiekben itt mélyített M-2 (1937) és M-3 (1941) fúrások meddőnek bizonyultak. Ezt követően Mihályitól ÉÉK-re, Mosonszentjános közelében folytatódott a fúrási tevékenység (M-4, 1944), amelynek célja az északi részmaximum felderítése volt. Azonban ez a fúrás is meddőnek bizonyult. Végül a répcelaki részmaximum feltárása 1944-45 között történt. Az M-5 fúrás elszerencsétlenedése után, a mellette lefúrt M-5/b már sikeresnek bizonyult. A fúrás 1410-1444 m között két alsó-pannóniai homokkőréteget harántolt, amelyből nagymennyiségű CO2-termelés folyt, és a neogén üledéksor aljzatát – a paleozoos metamorf összlet tetejét – 1460 m-ben érte el. Ezzel megkezdődött a mihályi és répcelaki CO2telepek iparszerű termeltetése, a gáz felhalmozása és hasznosítása.

A második kutatási periódusban Répcelakon és környékén az 1962 utáni három évben 20 fúrást mélyítettek, amelyek közül 10 bizonyult produktívnak. A gáztároló képződmények ezen a területen a paleozoos metamorf pala, miocén mészkő és homokkő, alsó- és felső-pannóniai homokkő. Jelentős eredmény az uraiújfalui kiemelkedésre telepített 12. sz. fúrásban észlelt, legmagasabban elhelyezkedő neogén üledék aljzata, az alsó-pannóniai homokkőrétegekben talált CO_2 gáz, és a felső-pannóniai összlet egy szakaszában tárolódó éghető földgáz. Sikerrel járt a Répcelak környéki felső-pannóniai rétegek kutatása is, ahol nem éghető kevertgázt, illetve CO_2 gázt találtak.

Mihályi környékén ugyanebben az időszakban 8 fúrást mélyítettek, amelyek közül 4 bizonyult produktívnak. Mészáros et al. (1979) szerint ezen a területen a felső-pannóniai összlet tartalmazza a Mihályi terület szén-dioxid-vagyonának legnagyobb hányadát (míg Répcelak területén az alsó-pannóniai rétegsor). Tehát ezen a területen a tároló képződményei: paleozoos metamorf pala, alsó-pannóniai konglomerátum, homokkő és felső-pannóniai homokkő.

Összesítve: a Mihályi-Répcelak területen a 46 lemélyített fúrásból 26 tárt fel CO₂-telepet (Mihályi: 15, Répcelak: 11), 2 db nem éghető kevertgáztelepet, míg Uraiújfalu mellett 10 szénhidrogén-gáztelepet azonosítottak (Mészáros et al. 1979).

Geológiai háttér

Metamorf képződmények

A Mihályi-Répcelak területen a neogén üledéksor alatt szilur-devon időszaki képződmények találhatók. Az aljzatot legmagasabban – 1573,5 m-ben – a Mihályi részmaximumon érték el. A szerkezet tetőzónáján a neogén fekü átlagos mélysége 1650–1700 m körüli (Mészáros et al. 1979).

A vizsgált Mihályi-Répcelak területen a feltárt metamorf aljzatból mintegy 40–50 m vastagságú összlet vált ismertté

(Mészáros et al. 1979), amelyet változó kőzetfáciesű, epi- és anchimetamorf palák építenek fel, helyenként karbonát-(főleg dolomit-) betelepüléssel. A legtöbb fúrásban fillit, mészfillit és kvarcfillit, továbbá 1-1 fúrásban szideritpala, mészpala, szericites kvarcpala, átalakult vulkanit, illetve kloritpala, dolomit, kloritfillit, szericitpala, agyagpala, homokkőpala és kvarcit fordul elő.

Neogén képződmények

A pliocén formáció képviseli a neogén üledékek döntő részét. A pannóniai emelet üledékei 1353-2387 m mélységtartományban találhatók, lepusztult paleozoos meatamorf és miocén összlet felszínére települve. A pliocén hézagmentes kifejlődésben csak a keleti és a nyugati minimum területén lelhető fel. A részmaximumok tetején észlelt a pannóniai emelet átlagos vastagsága 1450-1650 m, melyből az alsópannóniai üledék 200-800 m-es vastagságú. Ez az alsó-pannóniai képződmények üledéke főképp homokkőből, homokos agyagmárgából és aleurolit váltakozásából épül fel, amely ősmaradványokban szegény. Erre mintegy 1150-1450 m vastagságban uralkodóan pszammitos üledékekből álló felső-pannóniai és holocén-pleisztocén képződmények települnek. A felső- és alsó-pannóniai üledékes sorozat határa nem éles. Ebben a rétegtani szintben a részmaximumok legmagasabb részén agyagmárga-, a peremeken homokkő- és agyagmárga-, illetve aleurolitrétegek keletkeztek (Mészáros et al. 1979).

CO₂-telepek leírása

A Mihályi-Répcelak területen összesen 26 CO₂-telepet – amelyek felső- és alsó-pannóniai kőzetekben és a medencealjzatban vannak – és két kevertgáztelepet tártak fel, amelyek a felső-pannóniai homokkőrétegben találhatók.

- Ezek a CO₂ telepek a következők:
- Mihályi: a medencealjzat tetején és alsó-pannóniai konglomerátumban 1 db, alsó-pannóniai homokkőrétegekben
 3 db (Ap. I, Ap. II [ezen belül A, B]), a felső-pannóniai homokkőrétegekben 11 db (Fp-I, -II, -III, -IV, -V, -VI, -VIIb, -VIIa, -VIII, -IX, -X) telep,
- Répcelak: a medencealjzat tetején 1 db, miocén képződményekben 2 db (A, B), alsó-pannóniai homokkőrétegekben 1 db p. I. számú telep M-26-os fúrásban).

A Mihályi nagyszerkezet egy alaphegység alapú szerkezet. A medencealjzat tetején a paleozoos metamorf sorozatban kialakult felhalmozódás halmazteleptípusba, a miocén és alsó-pannóniai tárolók sztratigráfiailag és kőzettanilag árnyékolt rétegteleptípusba, a pliocén (alsó- és felső-pannon) telepek boltozatos, illetve kőzettanilag árnyékolt boltozatos rétegteleptípusba sorolhatók. A záró fedőréteg minden telep esetében pliocén agyagmárga.

A telepek elrendeződése Répcelak környékén nyugatról történő CO₂-migrációt jelez, mivel a szerkezet keleti szárnyán kiékelődő homokkőrétegek meddők. A területen érvényesül a sűrűség szerinti differenciáció. Mihályi-répcelaki területen a készletek fő tömegét a pliocén korú (alsó- és

Alsó-pannóniai CO ₂ -telepek	Tárolókőzet	Teleptípus	Vízáramlás, vízutánpótlás
Mihályi I.	agyagmárgacsíkos finom- és aprószemcsés homokkő	litológiailag árnyékolt rétegtelep	ÉNy felől várható utánáramlás
Mihályi II/A.	karbonátos kötőanyagú, finomszemcsés homokkő	litológiailag árnyékolt rétegtelep	víztestről nincs információ
Mihályi II/B.	finomszemcsés, agyagos homok	litológiailag árnyékolt rétegtelep	nincs információ
Répcelak I.	karbonátos kötőanyagú, aleuritcsíkos, finomszemcsés homokkő	litológiailag árnyékolt rétegtelep	becslések alapján gyenge vagy közepes utánáramlás
Répcelak II. (a legnagyobb gázvagyonnal rendelkező, legismertebb gáztelep)	helyenként gyengén rétegzett, vékony aleuritrétegekkel tagolt, karbonátos kötőanyagú, finomszemcsés homokkő	litológiailag árnyékolt rétegtelep	víztest ismerete nem kielégítő, vízutánpótlás kizárólag nyugatról várható
Répcelak III.	aleuritcsíkos, agyagos finomszemcsés homokkő	litológiailag árnyékolt rétegtelep	víztest aktivitása kicsi lehet, csak korlátozott vízutánpótlás
Répcelak IV.	finomszemcsés homokkő	litológiailag árnyékolt rétegtelep	vízutánáramlás egyoldalú, intenzitása valószínűleg gyenge
Répcelak V.	agyagos homokkő	litológiailag árnyékolt rétegtelep	vízutánpótlást csak nyugatról kap, ami jónak mondható
Répcelak VI.	agyagos aleurolitcsíkokkal és -padokkal tagolt finomszemcsés homokkő	litológiailag árnyékolt rétegtelep	vízutánpótlást csak nyugatról kap, ami jónak mondható
Répcelak VII.	agyagos, aleurolitpadokkal tagolt, finomszemcsés homokkő	litológiailag árnyékolt rétegtelep	nincs információ

1. táblázat A répcelaki és mihályi alsó-pannóniai CO₂-telepek összefoglaló táblázata

felső-pannóniai) rétegek tárolják (vastagság átlagosan 5–10 m).

CO2-telepek rétegtani helyzete

Az alapvetően metamorf anyagú magas rögvonulat tetején (a Mihályi-háton), *medencealjzati* helyzetben, mindkét gravitációs részmaximumon ipari értékű CO₂-felhalmozódás ismert.

Répcelakon a *miocén* összlet tetejéről 2 kútból folyik ipari értékű gáztermelés. A gázfelhalmozódás 2 önálló telepre osztható ("Miocén A telep"; "Miocén B telep"). Továbbá Répcelak közelében 7, Mihályi környékén 3 CO₂-telep alakult ki az *alsó-pannóniai* homokkőrétegekben. A hazai szén-dioxid-tárolási potenciál jelentős részét a vizsgálati területen is megjelenő alsó-pannóniai formáció teszi ki, ezért a továbbiakban az alsó-pannóniai telepekkel kívánunk részletesen foglalkozni. E telepek néhány litológiai és rezervoárgeológiai adatát az *1. táblázat* mutatja.

A Mihályi részmaximumon 11, a répcelaki területen 1 CO₂-telep van a felső-pannóniai rétegekben. A Mihályi területrész *felső-pannóniai összletében* mintegy 200–250 m-es vastagságban a kutatási terület legnagyobb gázfelhalmozódása alakult ki.

A Répcelak közeli fúrások a felső-pannóniai összlet alsó szakaszán 1140–1215 m között ipari értékű, nem éghető kevertgázt tartalmazó telepeket tártak fel, ahol két telepet különítettek el. A telepekről az alapadatok – pl. porozitás, permeabilitás, nyomás, hőmérséklet – hozzáférhetők. A telepek korbesorolása az eredeti kutatási eredményeket tükrözi, azonban ezek revíziója jelenleg folyamatban van.

Termodinamikai rendszerek

A szén-dioxid felszín alatti tárolásának egyik legalapvetőbb kérdése, hogy milyen körülmények uralkodnak a széndioxid besajtolása következtében egy potenciális tárolóformáció adott kőzet–fluidum rendszerében. A különböző hőmérséklet–nyomás tartományokban megváltoznak a fluidumrendszerben jelenlévő fluidumok fizikai és kémiai tulajdonságai, úm. a fluidumok halmazállapota, sűrűsége, oldhatósága, pH-ja, valamint – ezekkel összefüggésben – módosul a fluidum–kőzet kölcsönhatás intenzitása. A CO₂ felszín alatti tárolása esetében a két legfontosabb fluidum-

2. táblázat A H₂O és CO₂ legfontosabb adatai Roeder (1984) szerint

Fluidum	Hármaspont hőmérséklete (°C)	Hármaspont nyomása (bar)	Kritikus hőmérséklet (°C)	Kritikus nyomás (bar)	Kritikus sűrűség (kg/m³)	Moláris tömeg (g/mól)
H ₂ O	0,01	0,006	374,15	220,64	320	18,0153
$\rm CO_2$	-56,57	5,21	31,1	73,8	650	44,01



a A CO₂-H₂O bináris rendszer nyomás-hőmérséklet-összetétel (*p*-*T*-x) fázisdiagramja. Rövidítések: Q – 4 fázis (összetétel függvényében CO₂-H₂O folyadék-szilárd-gáz és klatrát halmazállapot) egyszerre van jelen, t_{(CO2}-H₂O) – a CO₂-H₂O hármaspontja, c_{(CO2}-H₂O) – a CO₂-H₂O kritikus pontja, LIQ – folyadék, SOL – szilárd fázis, VAP – gáz fázis (Diamond 2000)

1 The pressure–temperature–composition (*p*-*T*-*x*) phase diagram of the H₂O–CO₂ binary system. Abbreviations: Q – 4 phases are present at the same time (CO₂–H₂O liquid, solid, vapor and chlatrate), $t_{(CO_2-H_2O)}$ – triple-point of CO₂–H₂O, $c_{(CO_2-H_2O)}$ – critical point of CO₂–H₂O, LIQ – liquid, SOL – solid, VAP – vapor (Diamond 2000)

rendszer a CO₂ és a H₂O, amely "alaprendszerek" tulajdonságait a *2. táblázat* foglalja össze Roeder (1984) alapján.

Ha ez a két komponens fizikai kapcsolatba kerül a felszín alatt, akkor nem egymástól elkülönülve találhatók, hanem – a nyomás és hőmérséklet függvényében – egymással részben vagy teljesen elegyedve bináris rendszert alkotnak (1. ábra) (Roeder 1984, Diamond 2000).

A fluidumrendszerben a CO₂-tárolókra jellemző nyomás-, hőmérséklet-tartományban (100–175 °C (geotermikus gradiens és kútkönyvi adatok alapján), 100–250 bar (hidrosztatikai nyomás és kútkönyvi adatok alapján)) az alábbi fázisok lehetnek jelen: sc.CO₂, vízgőz, oldott CO₂-ot tartalmazó víz (Diamond 2000). A CO₂ vízben való oldhatósága változik a nyomás és a hőmérséklet függvényében (Spycher et al. 2003). Továbbá ismert tény a H₂O és CO₂ egyik kis *p*–*T* kondíció alatti reakciója, amelynek következtében szénsav keletkezik (ld. (1) egyenlet), és így a fluidumrendszer pH-ja kb. 7-ről jelentősen lecsökkenhet:

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3. \tag{1}$$

A H₂O–CO₂ kétkomponensű rendszer kísérleti adatainak alkalmazásával következtetni lehet a mélyben lejátszódó fizikai-kémiai folyamatokra. Azonban nyilvánvaló, hogy a rezervoárban lévő fluidum nem csupán szén-dioxidból és vízből áll, hanem különböző oldott sók is jelen vannak, amelyeknek nagy része NaCl. E hármas rendszerrel számos kutató foglalkozott már (pl. Bodnar 1995, Duan, Sun 2003), azonban jelenleg még nem áll rendelkezésre egy széles körben alkalmazható állapotegyenlet, amellyel az általunk vizsgált nyomás-, hőmérséklet- és összetételi tartomány teljes egészében leírható lenne. Bodnar (1995) olyan fázisdiagramot szerkesztett, amelyben jelzi, hogy a H_2O-CO_2 -NaCl hármas rendszer egyes nevezetes univariáns pontjai (pl. kritikus pontgörbéi vagy a szoliduszgörbe) hogyan alakulhatnak változó CO_2 - és NaCl-koncentrációk mellett (2. ábra).

A NaCl hozzáadásával a szén-dioxid oldhatósága H₂Oban fokozatosan csökken (Roedder 1984, Ellis és Golding 1963, Duan és Sun 2003). Erre irányuló kísérleteket végeztek például a norvég Sleipner porózus homokkő tárolóra (Portier, Rochelle 2005), melynek során szintetikusan előállított egy, a területre jellemző összetételű pórusvízben vizsgálták a CO₂ oldhatóságát a telepre jellemző nyomás- és hőmérséklet-tartományban. A kísérlet során azt tapasztalták, hogy a hőmérséklet növekedésével a CO₂ oldhatósága csökkent (pl. 18 °C, 100 bar, 1,36 mól/kg; 80 °C, 100 bar, 0,73 mól/kg), míg a nyomás növekedésével CO₂ oldhatósága a mesterséges pórusvízben nőtt (pl. 37 °C, 80 bar, 1,055 mól/kg; 37 °C, 120 bar, 1,183 mól/kg) (Portier, Rochelle 2005).

A Mihályi-Répcelak területéről származó 27, túlnyomó részt (83–99%-ban) CO₂-ot tartalmazó telepről állnak rendelkezésre olyan alapadatok, amelyek többek közt tartalmazzák a nyomás-, hőmérséklet-, NaCl-koncentráció-, víz–CO₂ térfogatarányokat. Részletesebb tanulmányozásra két olyan telepet választottunk, amelyek Magyarorszá-



A NaCl-H₂O-CO₂ hármas rendszer fázisdiagramja (Bodnar 1995). Követhető a H₂O nevezetes pontjainak módosulása különböző koncentrációban hozzáadott CO₂ és NaCl következtében, mind a H₂O-CO₂, a H₂O-NaCl és a H₂O-CO₂-NaCl rendszerben. A CO₂ hozzáadásával a H₂O kritikus pontja kisebb hőmérsékleten és nagyobb nyomáson van, míg NaCl hatására ugyanezen pont nagyobb nyomás-hőmérséklet tartományba kerül. Ha mind a két komponenst (CO₂ és NaCl) hozzáadjuk a H₂O rendszerhez, akkor a két szélsőérték közé fog kerülni ez a nevezetes pont

2 The phase diagram of the NaCl-H₂O-CO₂ triple system (Bodnar 1995). Note how characteristic points of H₂O change due to the added CO₂ and NaCl, in the H₂O-CO₂, H₂O-NaCl and H₂O-NaCl-CO₂ systems. The addition of CO₂ results in the shift of the critical point of H₂O to a higher pressure and lower temperature, while the effect of NaCl on the same point results in a higher pressure and temperature. If both components (CO₂ and NaCl) are added to the H₂O system, the points move between the extreme values

3. táblázat Mihályi, alsó-pannon II. telep és Répcelak, alsó-pannon II. telep alapadatai (Mészáros et al. 1979)

Telep neve	Nyomás (bar)	Hőmérséklet (°C)	CO ₂ :H ₂ O (v/V%)	NaCl (g/l)
Mihályi, alsó-pannon II.	151	73	60:40	10,3
Répcelak, alsó-pannon II.	147	75	70:30	14,3

gon a legpotenciálisabb, CO₂-tárolásra alkalmas formációban vannak (Fancsik et al. 2007, Berta et al. 2010), továbbá adataikat tekintve reprezentatívak a többi, Répcelak-Mihályi területen megjelenő telepek tekintetében. A két részletesebben vizsgált telep a *Mihályi, alsó-pannon II.* CO₂-telep, valamint a *Répcelak, alsó-pannon II.* CO₂telep, amelyeknek néhány alap-paraméterét a *3. táblázat* tartalmazza.

Ezen adatok alapján a telepekben lévő feltételezett fluidumfázisok a CO_2 – H_2O rendszer tekintetében a következők: sc. CO_2 , vízben oldott CO_2 és vízgőz.

Eredmények és diszkusszió

A 3. táblázat adatai alapján a pórusfluidumok mólszázalékos összetétele közismert összefüggésekkel kiszámolható, ami a

 CO_2 -telepek egyik jellemezője. Ehhez az alábbi adatok szükségesek: CO_2 sűrűsége adott nyomáson és hőmérsékleten (Span, Wagner 1996), a CO_2 és H₂O moláris tömege, valamint a két komponens térfogatszázaléka az adott telepben (4. táblázat). Ezek alapján a vizsgált telepekben a pórusfluidum CO_2 -tartalma kb. 20–35 mól% körül alakul (3. ábra).

A kiválasztott telepekre vonatkoztatott CO₂ vízben való oldhatóságának meghatározása az adott nyomás, hőmérséklet és NaCl-koncentráció függvényében (Mészáros et al. 1979) (*3. táblázat*) Duan és Sun (2003) munkája alapján történt (*4. ábra*). A telepekben a CO₂ oldhatósága tiszta H₂Oban 1,073–1,109 mól/kg között változik, míg H₂O-NaClban oldva 0,098–1,104 mól/kg közötti CO₂ lesz (Mészáros et al. 1979). A *4. ábrán* a "számított" mélység jelentése: a telepek mélysége korrigálva van a sókoncentrációval, így az esetleges többlet-NaCl méréshibák elkerülhetők. Erre azért

. táblázat	Mihályi, alsó-pannon II. telep és Répce	lak, alsó-pannon II. telep számolt	fizikai-kémiai állapotot jelző adatai
------------	---	------------------------------------	---------------------------------------

Telep neve	CO ₂ sűrűsége (kg/m ³)	CO ₂ oldhatósága (mól/kg)	CO ₂ :H ₂ O (mól%)	рН
Mihályi, alsó-pannon II.	491,71	1,091	24:76	2,93
Répcelak, alsó-pannon II.	459,61	1,074	32:68	2,94



3. ábra A CO₂-H₂O-összetétel háromdimenziós fázisdiagramjának a T₂ hőmérsékletnél (~70-80 °C) vett metszete a CO₂-H₂O fázisdiagram topológiájának alapján (Roeder 1984), amelyen a körök a mihályi, a négyzetek a répcelaki CO₂-telepeinek kondicióit jelölik (Diamond 2000 alapján)
 Figure 3 The T₂ temperature section of CO₂-H₂O 3-D phase diagram (based on the topology of CO₂-H₂O phase diagram) (Roeder 1984), where the

circles are sites of the Mihályi area, the squares are CO2 sites of Répcelak (based on Diamond 2000)



van lehetőség, mert a NaCl-tartalom és a nyomás korrelációja ebben az esetben nagyobb, mint 0,9.

A vizsgált telepek CO₂–H₂O rendszereinek pH-ra gyakorolt hatása a CO₂ parciális nyomásának függvényében a (2) egyenlet alapján számolható. A víz disszociációs állandója a hőmérséklet függvényében változik, ezzel együtt a víz ionszorzata is, amely 70–80 °C-on $7,5\cdot 10^{-12}$ mól²/l².

$$[\mathrm{H}^{+}] \cong \left[K_{w} + \frac{K_{h} K_{a_{1}}}{\mathrm{k}_{\mathrm{H}}} p_{\mathrm{CO}_{2}} \right]^{1/2}.$$
 (2)

A hidrogénkoncentráció meghatározása a (2) egyenlet alapján történik, amelyben p_{CO_2} a CO₂ parciális nyomása, K_w a víz ionszorzata, K_h hidratációs egyensúlyi állandó, K_{a_1} első disszociációs állandó és k_H a Henry-konstans.

Közismert kémiai és fizikai összefüggéseket és egyenleteket alkalmazva meghatározhatók az általunk két kiválasztott CO₂-telep fizikai-kémiai adatai, úgymint a CO₂ sűrűsége, a CO₂ oldhatósága, a CO₂–H₂O aránya és pH-ja (*4. táblázat*).

Jelen munka célja egy elméleti modellkísérlet volt, a két kiválasztott telepből kitermelhető CO₂ mennyiségének meghatározására. Azokkal a feltételekkel, hogy kitermelés során fázisátalakulás és drasztikus fizikai állapotváltozás nem történik a zárt rendszerben, és amely a kitermelés során nem töltődik fel vízzel, hanem a H₂O-ból kioldódó CO₂ lép a kitermelt CO₂ helyére. Továbbá az egyszerűsítés kedvéért feltételeztük, hogy a tároló kőzetanyaga tiszta kvarchomokkő, amely kémiailag inertnek tekinthető a CO₂–H₂O rendszerre nézve. A 2. és 3. táblázatban láthatók a telepekre jellemző fizikai-kémiai adatok. Ezek alapján elmondható, hogy a telepen belül van sc.CO₂, CO₂-ban telített H₂O, valamint vízgőz (a fázisdiagram szerint). Ezek közül a nyomáscsökkenés hatására – amelynek oka a CO₂ kitermelése, továbbá a vízutánpótlás hiánya – elsőként a sc.CO₂ alakul át gáz halmazállapotúvá, ami a tanulmányozott telepekben 73–75 °C hőmérsékleten kb. 74 bar nyomáson következik be. Ekkor a telepekben a csökkenő nyomás következtében megnövekszik az oldott CO₂ részaránya, csökken az oldhatósága a H₂O-ban és a sűrűsége, és a fluidumnak kismértékben emelkedik a pH-ja (5. táblázat) a telep jelenlegi, ismert adataihoz képest (3. és 4. táblázat) (Mészáros et al. 1979).

Ezek alapján Mihályi esetében 24 mól%-ról 9,1 mól%-ra csökken a sc. CO₂ mennyisége, azaz egységnyi pórustérfogatból maximálisan (tehát a fázisátalakulás bekövetkeztéig) 203 kg termelhető ki. Ezzel szemben Répcelak esetén 47 mól%-ról 13,4 mól%-ra csökkent a sc. CO₂ mennyisége (5. *ábra*), így egységnyi térfogatból 216 kg termelhető ki (Roeder 1984, Diamond 2000). Ennek a különbségnek az oka egyrészről a CO₂: H₂O térfogatarányával magyarázható, másrészről a telep fizikai kondícióinak különbségével.

A számítások során eltekintettünk attól a ténytől, hogy a termelés során bekövetkező nyomáscsökkenés hatására a H_2O -ban oldott CO_2 -tartalom csökken, így a felszabadult CO_2 is kitermelhetővé válik a rendszerből. A CO_2 oldhatóságváltozása H_2O -ban a Mihályi alsó-pannon II. telep ese-

5. táblázat Mihályi, alsó-pannon II. telep és Répcelak, alsó-pannon II. telep adatai a kitermelés végeztével

Telep neve	Nyomás (bar)	Hőmérséklet (°C)	CO ₂ :H ₂ O (v/V%)	CO ₂ sűrűsége (kg/m ³)	CO2 oldhatósága (mól/kg)	CO ₂ :H ₂ O (mól%)	рН
Mihályi, alsó-pannon II.	74	73	60:40	153,456	0,768	9,1:90,9	3,09
Répcelak, alsó-pannon II.	74	74,5	70:30	151,554	0,758	13,4:86,6	3,09



tén 1,091 mól/kg-ról 0,768 mól/kg-ra csökken, ennek alapján egységnyi térfogatot tekintve 5,45 kg CO₂ szabadul fel. Így az egész telepet tekintve a kitermelés mennyisége az oldhatóság változását figyelmen kívül hagyó esethez képest 2,6%-kal nő. A répcelaki alsó-pannon II. telep esetében az oldhatóság 1,074 mól/kg-ról 0,758 mól/kg-ra csökken, ebből következik, hogy egységnyi térfogatban 3,98 kg CO₂ szabadul fel, azaz a kitermelhető CO₂ mennyisége 1,8%-kal nő (*6. táblázat*).

A természetben azonban nem inert a fluidumrendszer az azt magában foglaló kőzettesttel, hanem azzal kémiai egyensúlyra törekszik. Ebből következik, hogy a nyomás csökkenésével a jelen esetben NaCl-mentes H₂O–CO₂ rendszerből nem biztos, hogy felszabadul az előzőekben becsült CO₂-mennyiség, hanem reakcióba lép a körülvevő kőzetanyaggal. Továbbá, hogy a kőzetben lévő ásványok oldhatósága a pH-változás miatt nő (Ketzer et al. 2009). Az alsó-pannon II. telepek tárolókőzete a Szolnoki Formációt alkotó homokkő (Juhász 1998). E kőzet fő ásványai a kvarc, a kalcit, a földpát, valamint a csillám (Berta et al. 2010). Ezek közül a pH-változásra a legérzékenyebb ásvány a kalcit (ld. (3) egyenlet), amely a rendszerben pufferként viselkedik:

$$CaCO_3 + H^+ \rightleftharpoons Ca^{+2} + HCO_3^-.$$
 (3)

Az egyensúlyi reakciónak köszönhetően a rendszerben a kezdeti pH nem 2,9 körüli érték, hanem kvázisemleges (7,0) (Huddart, Stott 2010). Ez jó összhangban van a répcelaki és mihályi területekről származó, a szén-dioxiddal egyensúlyban lévő pórusfluidumokban mért pH-értékekkel. Azonban a CO₂-kitermelés hatására a H⁺-koncentráció csökken a folyadékfázisban, így a folyadék Ca²⁺-tartalomra túltelített lesz, ennek következtében pedig szilárd CaCO₃ válhat ki (Duan, Li 2002). Azonban a kalcit oldhatósága nemcsak a

Telep neve	Kitermelhető CO ₂ -mennyiség (kg/m ³)	H2O-ból felszabadult CO2 (kg/m ³)	H ₂ O-ból felszabaduló CO ₂ hozzájárulása a kitermeléshez (%)	Oldhatóságot figyelembe véve kitermelhető CO ₂ -mennyiség (kg/m ³)
Mihályi, alsó-pannon II. telep	203	5,45	2,6	208,3
Répcelak, alsó-pannon II. telep	216	3,98	1,8	233,28



 CO_2 -tartalom függvényében változik, hanem a rendszer p-T viszonyaitól is függ (6. *ábra*). Megfigyelhető, hogy a nyomáscsökkenés hatására is csökken a kalcit oldhatósága (6. *ábra*) (Coto et al. 2012).

Földpát a másik ásvány, amely az adott körülmények között reakcióba léphet a fluidummal az alábbiak (ld. (4) egyenlet) szerint:

$$KAlSi_{3}O_{8} + 2H_{2}O + CO_{2} \Rightarrow$$

$$f\ddot{o}ldp\dot{a}t$$

$$\Rightarrow Al_{2}Si_{2}O_{5}(OH)_{4} + K_{2}CO_{3} + 4SiO_{2}.$$

$$kaolinit kvarc$$
(4)

A földpát (a példa szerint K-földpát) oldhatósága is az oldott CO₂-koncentrációval egyenes arányosságban van a kalcithoz hasonlóan, azonban a földpát reakciója során kaolinit is keletkezik (Huddart, Stott 2010). Mindezek alapján, tehát kijelenthető, hogy a fent említett két ásvány (kalcit és földpát) oldhatósága a CO₂-kitermelés során csökken.

Azonban egy esetleges CCS projekt keretében az ipari folyamatokból leválasztott CO2-nak nem kitermelése, hanem besajtolása történik egy sósvizes rezervoárba. Magyarországon a CO2 tárolásának legnagyobb potenciálját az alsó-pannóniai Szolnoki Formáció adja (Fancsik et al. 2007), amelyben a tárolókőzet alaptulajdonságai hasonlók lehetnek, mint a répcelaki alsó-pannon II. telep, valamint mihályi alsó-pannon II. telep fizikai és kémiai kondíciói. Azonban az előzőkben bemutatott elméleti modellt meg kell fordítani ahhoz, hogy követetni lehessen a rezervoárban lezajló folyamatokat, ahol a kezdeti sósvíz pH-ja kb. 7, amely a CO₂-besajtolás során először jelentősen csökken kb. pH = 3-ra. Azonban már az injektálás során, illetve annak befejezését követően a fluidum-kőzet között beáll a kémiai egyensúly, így a pH fokozatosan nő. E folyamat során a kőzet szerkezete folyamatosan változik, mivel a savas kémhatás következtében a kalcit és/vagy a földpát oldódni fog. Az egyensúly beállásának következtében a lokális telítettségi viszonyok függvényében kalcit és kaolinit válhat ki a (2) és (4) egyenlet alapján. Mindezen oldódási, kiválási folyamatok pedig hatással lehetnek a tárolókőzetek porozitására és permeabilitására, amely eleinte növekszik, majd csökken – továbbá ezzel összefüggésben a kőzetfizikai tulajdonságaira is.

Konklúzió

Munkánkban az ipari eredetű CO₂ tárolásakor fellépő folyamatok közül néhány esetet vázoltunk fel a mihályi és répcelaki mezők természetes CO₂-előfordulásainak példáján. A vizsgált telepek mindegyikében az alábbi fluidumfázisokat különíthetjük el: sc. CO₂, H₂O-ban oldott CO₂ és vízgőz. A CO₂ oldhatósága a vízben a mélység függvényében csökkent, továbbá a NaCl-koncentrációval fordított arányosságban áll.

A mihályi *alsó-pannon II.* telepből elméleti modell alapján, egységnyi pórustérfogatból 208 kg CO₂ termelhető ki, míg a répcelaki *alsó-pannon II.* telep esetén ez az érték 233 kg. A kitermelés függvényében, a fázisátalakulásig a rendszerben a CO₂ sűrűsége negyedére, míg az oldhatóság 0,2 mól/kg-mal csökken, ezzel ellentétben a pH 0,15-dal nő. A kémhatás változásának következtében a telepet felépítő homokkő érzékeny ásványainak (kalcit, földpát) oldhatósága csökken a CO₂ parciális nyomáscsökkenés hatására, ami befolyásolja a kőzet porozitását és permeabilitását is.

A kitermeléssel ellentétes hatásokat eredményez a CO₂ besajtolása egy felszín alatti tárolóba. A tároló hosszú távú biztonságának szavatolása érdekében ismerni kell a jelenlévő H₂O–CO₂–NaCl fluidumrendszer fizikai-kémiai sajátosságait, valamint a fluidum és a tárolókőzet ásványai között a fizikai és kémiai paraméterekben létrehozott változás hatására bekövetkező reakciókat az adott tároló nyomás–hőmérséklet tartományában, ami fázis diagramok alkalmazásával jó megközelítésnek bizonyult az esettanulmány alapján. Jelenlegi ismereteink alapján Magyarországon a legnagyobb tárolási potenciált a sósvizes rezervoárok adják. A tárolás biztonságát, a rezervoárok elszigeteltségét és az egyéb célú használatot figyelembe véve az alsó-pannóniai Szolnoki Formáció tűnik leginkább alkalmasnak a széndioxid hosszú távú biztonságos tárolására.

A tanulmány szerzői

Király Csilla, Szamosfalvi Ágnes, Falus György, Szabó Csaba, Sendula Eszter

Köszönetnyilvánítás

A cikk szerzői köszönetüket fejezik ki Berta Mártonnak és Szabó Ábelnek a segítségért. A kutatómunka részben a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részeként – az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, részben a CGS Europe (FP7 256725) támogatásával valósult meg. Ez a tanulmány a Litoszféra Fluidum Kutató Labor (ELTE, TTK, FFI) 67. publikációja, amely a Magyar Földtani és Geofizikai Intézettel kötött együttműködés keretében született.

Hivatkozások

- Berta M., Király Cs., Falus Gy., Juhász Gy., Szabó Cs., 2011: Preliminary physical and geochemical study on a sedimentary rock series of the Pannonian Basin for CCS (Hungary). Energy Procedia 4, 4719–4723
- Bodnar R. J., 1995: Applications of synthetic fluid inclusions in supercritical water oxidation research. 21th International Conference on the Properties of Water and Steam (in Press)
- Coto B., Martos C., Pena J. L., Rodríguez R., Pastor G., 2012: Effects in solubility CaCO₃: Experimental study and model description. Fluid Phase Equilibria 324, 1–7
- Czernichowski-Lauriol I., Pauwels H., Vigouroux. P., Le Nindre Y. M., 2002: The French carbogaseous province: an illustration of natural processes of CO₂ generation, migration, accumulation and leakage in GHGT-6 – Kyoto – Japan – 01-04/10/2002, Vol. I, pp. 411–416
- Diamond L.W., 2000: Introduction to Phase Relations of CO₂–H₂O Fluid Inclusions. Fluid Inclusions in Minerals: Methods and applications (eds. B. De Vivo, M. Luce Frezzotti).
- Duan Z., Li D., 2002: Coupled phase and aqueous species equilibrium of the H₂O–CO₂–NaCl–CaCO₃ system from 0 to 250 °C, 1 to 1000 bar with NaCl concentrations up to saturation of halite. Geochemica et Cosmochimica Acta 72, 5128–5145
- Duan Z., Sun R., 2003: An improved model calculating CO₂ solubility in pure water and aqueous NaCl solutions from 273 to 533 K and from 0 to 2000 bar. Chemical Geology 193, 257–271
- Ellis A. J., Golding R. M., 1963: The solubility of CO₂ above 100 °C in water and NaCl solutions. Am. J. Sc. 261, 47–60
- Fancsik T., Török K., Törökné Sinka M., Szabó Cs., Lenkey L., 2007: Az ipari tevékenységből származó szén-dioxid hosszú távú elhelyezésének lehetőségei Magyarországon. In: Stratégiai Kutatások 2006–2007: kutatási jelentések. Magyar Tudományos Akadémia – Miniszterelnöki Hivatal, pp. 89–119
- Holloway S., 2007: Carbon Dioxide Capture and Geologic Storage, Trans. R. Soc. A 365, 1095–1107

- Huddard D., Stott T., 2010: Earth Environments, Past, Present and Future. Wiley and Sons, pp. 896
- Ketzer J. M., Iglesias R., Einloft S., Dullius J., Ligabue R., de Lima V., 2009: Water–Rock–CO₂ interactions in saline aquifers aimed for carbon dioxide storage: Experimental and numerical modeling studies of the Rio Bonito Formation (Permian), southern Brazil. Applieg Geochemistry 24, 760–767
- Maurand N., 2009: szóbeli előadás a "CO₂ Geological Storage: Latest Progress" konferencián Obergurglben
- Mészáros L., Dallos E., Vágó L., Czupi J., Paulik D., Darabos A., Marton T., Simán Gy., Ferenczy Z., 1979: A Mihályi kutatási terület lehatároló fázisú zárójelentése, a szén-dioxid- és a "nem égethető" kevert gáztelepek vagyonszámítása, Országos Kőolajipari Tröszt, pp. 116.
- Pearce J. M. (ed.), 2002: NASCENT, Natural Analogues for the Storage of CO₂ in the Geological Environment, Work Package 1: Data collation, review and site selection. First Interim Report of Energy, Environment and Sustainable Development Programme, project No. ENK5-CT-2000-00303, 188 pp.
- Pearce J. M., Shepherd T. J., Kemp S. J., Wagner D., Rochelle C. A., Bouch J.E. (British Geological Survey), Nador A., Baker J., Vető I., Toth G. (MAFI), Lombardi S., Annuziatellis A., Beaubien S.E., Ciotoli G. (URS), Pauwels H., Czernichowski-Lauriol I., Gaus I., Le Nindre Y-M., Girard J-P., Petelet-Giraud E., Serra H. (BRGM), le Guern-Marot C., Schrott B., Orlic B., Schuttenhelm A. (TNO), Hatziyannis G., Metaxas A., Spyridonos E. (IGME), Gale J., Manancourt A. (IEA GHG), Brune St., Hagendorf J., Teschner M., Faber E., Poggenburg J. (BGR), Iliffe J. (BP), Kross B., Alles S., Hildenbrand S. (RWTHA), Heggland R. (STATOIL), 2005: Natural analogues for the geological storage of CO2, NASCENT project, p. 92
- Portier S., Rochelle C., 2005: Modelling CO₂ solubility in pure water and NaCl-type waters from 0 to 300 °C and from 1 to 300 bar. Application to the Utsira Formation at Sleipner. Chemical Geology 217, 187–199
- Roedder E., 1984: Fluid Inclusions. Reviews in Mineralogy 12., Mineralogical Society of America, p. 646
- Span R., Wagner W., 1996: A new equation of state for carbon dioxide covering the fluid region from the triple-point temperature to 1100 K at pressures up to 800 MPa. Journal of Phys. Chem. Data 25/6, 1509–1596
- Spycher N., Pruess K., Ennis-King J., 2003: CO₂–H₂O mixtures in the geological sequestration of CO₂. I. Assasment and calculation of mutual solubilities from 12 to 100 °C and up to 600 bar. Geochmimica et Cosmochimica Acta 67, 3015–3031
- Vető et al., 2003: Geochemistry of CO₂ Rich gases in te Pannonian Basin with emphais on the Mihályi-Répcelak gas fields and the Mátraderecske gas seepage – thermal water system. NASCENT Project, Manuscript
- Wildenborg T., Bentham M., Chadwick A., David P., Deflandre J-P., Dillen M., Groenenberg H., Kirk K., Le Gallo Y., 2009: Largescale CO₂ injection demos for the development of monitoring and verification technology and guidelines (CO2ReMoVe). Energy Procedia 1, 2367–2374
- Yan W., Huang S., Stenby E. H., 2011: Measurement and modeling of CO_2 solubility in NaCl brine and CO_2 -saturated NaCl brine density. International Journal of Greenhouse Gas Control 5, 1460–1477